

حقن تنظيم الأسرة أحادية الهرمون كل ٣ شهور (ديبوفيرا)




- حقن تنظيم الأسرة آمنة وفعالة.
- يمكن استخدامها للسيدات المرضعات بعد ٦ أسابيع من الولادة.
- يمكن استخدامها للسيدات غير المرضعات بعد الولادة و استخدامها بعد الإجهاض.
- تؤخذ أول مرة أثناء الدورة الشهرية ويفضل في اليوم الأول من نزول الحيض.

الكشف الطبي ضروري قبل استخدام
أى وسيلة لتنظيم الأسرة.

- حقن تنظيم الأسرة تؤخذ في العضل كل ثلاثة أشهر بانتظام.
- يتم قياس الضغط والوزن بصورة دورية.
- يجب أخذ الحقنة التالية في الميعاد المحدد لضمان فاعليتها.
- قد تحدث بعض الأعراض الجانبية البسيطة في بداية الاستخدام و لكن سرعان ما تختفى مثل :
عدم انتظام الدورة الشهرية - نزول قطرات دم في غير أوقات الحيض - انقطاع مؤقت للحيض.

يجب الرجوع للطبيب واستشارته في أسرع وقت في حالة:

- ألم شديد في البطن أو الصدر أو الساقين.
- صداع شديد غير معتاد.
- صداع نصفي مصحوب بأعراض منذرة.
- اصفرار الجلد أو العين.



لا تتوقفي عن استعمال الوسيلة
إلا باستشارة الطبيب